



Hasta Adı:
Hasta Sahibi:
Başlangıç Tarihi:
Kilo (kg):
BSA (m²):

Feline Lenfoma Chop Protokolü Depo Steroid

		TARİH	DOZ	KG/M ²
1. hafta	Vincristine 0.7 mg/m ² IV SID L-Asparaginase 400 U/kg Depo Steroid 2 mg/kg IM			
2. hafta	Cyclophosphamide 250 mg/m ² IV SID			
3. hafta	Vincristine 0.7 mg/m ² IV Depo Steroid 2 mg/kg IM			
4. hafta	Doxorubicin 20 mg/m ² IV SID			
6. hafta	Vincristine 0.7 mg/m ² IV SID Depo Steroid 2 mg/kg IM			
7. hafta	Cyclophosphamide 250 mg/m ² IV SID			
8. hafta	Vincristine 0.7 mg/m ² IV			
9. hafta	Doxorubicin 20 mg/m ² IV SID Depo Steroid 2 mg/kg IM			
11. hafta	Vincristine 0.7 mg/m ² IV SID			
13. hafta	Cyclophosphamide 250 mg/m ² IV SID Depo Steroid 2 mg/kg IM			
15. hafta	Vincristine 0.7 mg/m ² IV SID			
17. hafta	Doxorubicin 20 mg/m ² IV SID Depo Steroid 2 mg/kg IM			
19. hafta	Vincristine 0.7 mg/m ² IV SID			
21. hafta	Cyclophosphamide 250 mg/m ² IV/PO SID Depo Steroid 2 mg/kg IM			
23. hafta	Vincristine 0.7 mg/m ² IV SID			
25. hafta	Doxorubicin 20 mg/m ² IV SID Depo Steroid 2 mg/kg IM			
29. hafta	Depo Steroid 2 mg/kg IM			
34. hafta	Her 8 haftada bir Depo Steroid 2 mg/kg IM			

Kemoterapi uygulamalarından önce 24 saat içerisinde tam kan sayımı yapılmalıdır.

Aşağıdaki durumlarda kemoterapi 3-7 gün ertelenmeli ve yeniden tam kan sayımı yapılmalıdır:

- Nötrofil sayımı ≤ 2.000 cells/ μ l ise;
- Trombosit sayımı ≤ 50.000 cells/ μ l ise;
- Hasta bir önceki kemoterapiye bağlı sindirim sistemi sorunları yaşamaktaysa.

Kısaltmalar: IV, intravenöz; PO, ağızdan; SID, günde bir kez; IM, intramusküler.

Referans: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6056137