



Hasta Adı:
Hasta Sahibi:
Başlangıç Tarihi:
Kilo (kg):
BSA (m²):

Vinblastine Protokolü (Köpek)

		TARİH	DOZ	KG/M ²
1. hafta	Vinblastine 2 mg/m ² IV Prednisone 2 mg/kg PO SID			
2. hafta	Vinblastine 2 mg/m ² IV Prednisone 1,5 mg/kg PO SID			
3. hafta	Vinblastine 2 mg/m ² IV Prednisone 1 mg/kg PO SID			
4. hafta	Vinblastine 2 mg/m ² IV Prednisone 1 mg/kg PO SID			
6. hafta	Vinblastine 2 mg/m ² IV Prednisone 1 mg/kg PO SID			
8. hafta	Vinblastine 2 mg/m ² IV Prednisone 1 mg/kg PO SID			
10. hafta	Vinblastine 2 mg/m ² IV Prednisone 1 mg/kg PO SID			
12. hafta	Vinblastine 2 mg/m ² IV Prednisone kesilecek			

Kemoterapi uygulamalarından önce 24 saat içerisinde tam kan sayımı yapılmalıdır.

Aşağıdaki durumlarda kemoterapi 3-7 gün ertelenmeli ve yeniden tam kan sayımı yapılmalıdır:

- Nötrofil sayımı ≤ 2.000 cells/ μ l ise;
- Trombosit sayımı ≤ 50.000 cells/ μ l ise;
- Hasta bir önceki kemoterapiye bağlı sindirim sistemi sorunları yaşamaktaysa.

Kısaltmalar: IV, intravenöz; PO, ağızdan; SID, günde bir kez.